

Восстановление функционирования слизистой полости рта

с помощью Ребон. Гель для дёсен

Ребон. Гель для десен содержит сигнальные белки, способствующие нормализации регенеративных процессов после оперативного вмешательства, контролирующие процесс восстановления. Существенно снижает риск осложнений в постоперационном периоде.

Гель для десен эффективно справляется с широким спектром задач:

- нормализует плотность десен (укрепление),
- способствует быстрому заживлению повреждений слизистой,
- нивелирует очаги воспаления в полости рта,
- облегчает состояние десен после профессиональных гигиенических процедур.

Пример протокола для использования в качестве самостоятельного средства в ортодонтической практике

Ребон. Гель для десен следует наносить после гигиенических процедур на образовавшиеся воспалительные элементы и другие дефекты слизистой поверхности полости рта.

1. Возьмите из холодильника пару флаконов средства «Ребон. Гель для дёсен» - 1 флакон с «активными ингредиентами», 1 флакон с гелевым «растворителем» и одну пипетку. Вместо пипетки в комплекте может находиться стерильный безигольный шприц - используйте его для смешивания составов.
2. Видео-инструкцию по подготовке средства можно посмотреть, отсканировав **QR-код** справа. Откройте флаконы. Переместите растворитель во флакон с активными компонентами с помощью пипетки (не перемешивайте, только соедините компоненты). Оставьте флакон с полученным средством (Гель) при комнатной температуре на 5-10 минут.
3. Возьмите флакон с приготовленным Гелем и перемешайте получившееся средство с помощью пипетки/шприца. Нанесите Гель на очаг воспаления слизистой.



После нанесения Геля не следует полоскать рот, пить и принимать пищу в течение часа.

Применение Ребон. Гель для дёсен показано при обнаружении воспалительных элементов: 1 доза 2 раза в день после выполнения гигиенических процедур. Продолжать применение до полного исчезновения повреждений (не менее 4-х доз).

Количество флаконов Ребон. Гель для дёсен на курс – 3-5 доз.